


A thick black L-shaped frame is positioned around the text. It starts at the top left, goes right, then down, then right again, and finally down to the bottom right corner.

TENDINOPATHIE MOYEN GLUTÉAL ?

ANAMNESE



- JF 17 ANS
- DEPUIS UN AN DOULEUR DE HANCHE
- REISTANTE AINS ET KINE
- SPORTIVE
- PAS D'AUTRE PATHOLOGIE

CLINIQUE

- HANCHE LIBRE
- PAS D'ARGUMENT POUR RADICULALGIE
- DOULEUR « EXQUISE » GD TROCHANTER
- INFILTRATION TEST XYLOCÏNE EFFICACE

IMAGERIE

- ECHO SANS PARTICULARITE
- IRM NORMALE




Im: 20/50
Se: 502

A

19/08/2003 F
Centre Clinical
664545271

IRM DE LA HANCHE DROITE SANS INJECTION
eAXIAL PDW_SPAIR SENSE





Im: 22/40
Se: 302

S

19/08/2003 F
Centre Clinical
664545271

IRM DE LA HANCHE DROITE SANS INJECTION
eCORO T1W_TSE SENSE





IMAGERIE

- HYPERSIGNAL INSERTION MOY GLUTÉAL ????

C A T

- INFILTRATION CORTICOIDES ??
- KINE SIMPLE ??
- AINS (LOC ET GENERAL) INEFFICACES

Conclusion

- Gabrielle présente une tendinite du moyen fessier droit, complication classique chez les gymnastes, danseurs
- L'IRM confirme la présence d'une bursopathie qui dans les mouvements de flexion de hanche donne des sensations de ressaut
- Discussion de la PEC : kiné/infiltration mais il existe un problème de récurrence et chronicisation de la douleur

Importance des protocoles de rééducation (renforcement musculaire dans l'axe).