

Critères de qualité de l'audit clinique

Rechercher dans chaque dossier la présence (ou non) de chacun des 10 critères suivants

Si pour un dossier donné une question apparaît sans objet, répondre NA (non adaptée).

1) J'ai réalisé une ponction intra-articulaire avec recherche de cristaux de PPC

OUI / NON / NA

2) J'ai complété l'examen de la ponction IA par une étude bactériologique en cas de liquide macroscopiquement purulent

OUI / NON / NA

3) J'ai réalisé des clichés radiographiques des articulations douloureuses à la recherche de dépôts de CCA

OUI

/ NON / NA

4) J'ai recherché des locations radiographiques « usuelles » de CCA : genoux, poignets, bassin

OUI / NON

/ NA

5) J'ai recherché des localisations arthrosiques atypiques évocatrices de CCA articulaire

(métacarpophalangiennes, scapho-trapézienne sans rhizarthrose, radiocarpienne)

OUI / NON / NA

6) J'ai réalisé une échographie des poignets et des articulations symptomatiques en

l'absence de CCA radiographique

OUI / NON / NA

7) J'ai notifié dans le dossier la description échographique du dépôt de CPPD dans les articulations (bandes hyperéchogènes / spot hyperéchogènes DANS le cartilage) et PAS d'aspect de double contour (= pas goutte)

OUI / NON / NA

8) J'ai réalisé un bilan biologique de CCA secondaire = maladies prédisposantes : (bilan martial, bilan phosphocalcique, magnésémie, formes familiales) notamment dans les cas de CCA précoce et/ou particulièrement floride

OUI / NON / NA

9) J'ai décrit dans le dossier la topographie de l'atteinte (mono, oligo, poly, rachidienne, C1-C2, etc...) et forme clinique (aigue, récurrente, persistante)

OUI / NON / NA

10) J'ai recherché des éléments cliniques et biologiques pouvant contre-indiquer l'utilisation des traitements conventionnels (colchicine, corticoïdes, AINS, méthotrexate) utilisables pour le traitement de la chondrocalcinose articulaire

OUI / NON / NA